

## Immunoprolaktika ekspertkomisjoni 07.09.2021 koosoleku päevakord ja ettepanekud

### PÄEVAKAVA

1. Immuunpuudulikkusega inimestele COVID 19 vaktsiinide lisadooside võimaldamine
2. COVID-19 vaktsiinide tõhususdoosid
3. Läbipõdenute vaktsineerimise aja täpsustus

### ETTEPANEKUD

1. Immuunpuudulikkusega inimestele COVID 19 vaktsiinide lisadooside võimaldamine

**Lisadoosi** vajavad vaktsineerimiskuuri sisuliseks lõpetamiseks tõsise immuunpuudulikkusega inimesed, kellel ei teki kahe doosiga (või Jansseni vaktsiini puhul ühe doosiga) piisavat kaitset.

COVID-19 vastase vaktsiini lisadoosi lubada immuunpuudulikkusega inimestele arsti otsusel, patsiendi nõusolekul esmase vaktsineerimiskuuri osana vastavalt komisjonis kinnitatud sihtrühmale.

Lisadoosi võib manustada alates 28 päeva möödumisel pärast teist doosi (1-dosilise vaktsiini puhul alates 28 päeva möödumisel pärast esimest doosi).

Lisadooside tegemiseks kasutada mRNA vaktsiine.

Kui kuur on läbitud kindla tootja mRNA vaktsiiniga, on soovitatav lisadoos manustada võimalusel sama tootja mRNA vaktsiiniga.

Ühe vaktsiinitootja mRNA vaktsiiniga alustatud vaktsineerimiskuurid on soovitatav võimalusel lõpetada sama vaktsiinitootja vaktsiiniga.

Nõrgestatud immuunsusega sihtrühmad, kellele on lisadoosi tegemine näidustatud:

Sihtrühm	Täpsustus
- luuüdi transplanteeritud patsiendid	(transplanteeritud viimase 2a jooksul või kui immuunsupressiivsel ravil) – Z94.8
- mõõduka või raske primaarse immuunpuudulikkusega patsiendid	D80-D84, D70-D71
- aktiivravil hematoloogilise kasvajaga patsiendid	
- onkopsüüfilisel aktiivravil olevad soliidtuumoriga patsiendid	
- soliidorgani transplantatsiooni järgne patsient, kes saab immuunsupresseerivat ravi	Z94
- püsivalt kõrges doosis glükokortikoidravi või muud immuunsupresseerivat ravi saavad patsiendid	20mg/d prednisolooni või selle ekvivalent, metotreksaat, asatiopriin, tsüklofosfaamid, tsüklosporiin, takroliimus, siroliimus, monoklonaalsed antikehad
- madala CD4+ väärtusega (<200) HIV-positiivsed	

## 2. COVID 19 vaktsiinide tõhustusdooside kasutuselevõtt

**Tõhustusdoosi** võivad vajada vaktsineerimiskuuri saanud inimesed immuunsuse nõrgenemise tõttu teatud pikema ajaperioodi möödudes.

Komisjonil jälgida uuringute andmeid ja Euroopa Raviameti luba tõhustusdooside manustamise osas.

Jätkata tõhustusdooside manustamise alustamiseks vajalike ettevalmistustega, et olla valmis võimaluse tekkimisel koheselt alustama, eelduslikult oktoobris.

## 3. COVID-19 haiguse läbipõdenuid vaktsineerida soovitavalt kuuendal kuul pärast tervenemist.