

Päevakord

1. COVID-19 vaksineerimise hetkeseis (ülevaade, arutelu);
2. COVID-19 vastane revaksineerimine (arutelu);
3. Inimesed, kelle COVID-19 vastane vaksineerimine ei ole võimalik tervislikel põhjustel
4. Muud küsimused.

Otsused/seisukohad

1. **COVID-19 vaksineerimise hetkeseis:** Kuna valdav enamus raske covid-19 haigusega haiglasse sattunud haigetest on vaksineerimata, siis on kõige olulisem jätkuvalt vaksineerida veel vaksineerimata inimesi, eriti vanemaealisi, kelle haiglasse sattumine on tõenäolisem. Vaksineerimata inimene nakatub 4 korda sagedamini ja satub haiglasse 8-10 korda sagedamini kui täielikult vaksineeritu.
2. **COVID-19 vastane revaksineerimine:** Revaksineerimise asemel soovitab komisjon kasutada edaspidi **lisadoosi** ja **tõhustusdoosi** termineid. **Lisadoosi** vajavad vaksineerimiskuuri sisuliseks lõpetamiseks tõsise immuunpuudulikkusega inimesed, kellel ei teki kahe doosiga (või Jansseni vaktsiini puhul ühe doosiga) piisavat kaitset. Nendeks on näiteks elundsiirdamise järgsed haiged, pahaloomulise kasvajaga inimesed spetsiifilisel immuunsupresseerival ravil (diagnooside loetelu täpsustab komisjon järgneval nädalal). **Tõhustusdoosi** võivad vajada vaksineerimiskuuri saanud inimesed immuunsuse nõrgenemise tõttu teatud ajaperioodi möödudes, kuid praegu ei ole selle kohta piisavalt andmeid (vt lisaks punkt 2b).
 - a. Komisjon peab oluliseks teha ettevalmistusi kõigepealt esmajärjekorras **lisadooside** manustamise alustamiseks. Soovituse tõsise immuunpuudulikkusega inimestele lisadooside manustamise kohta saab komisjon langetada pärast Norra teadlaste vastavasisulise teadusuuringu valmimist. Uuringu tulemusi on oodata eeldatavalt septembri jooksul, mille järgselt tullakse teema juurde tagasi septembri II pooles.
 - b. **Tõhustusdooside** manustamise soovitus andmiseks kõigile vaksineeritutele ei ole praegu piisavalt teadusandmeid. Samuti ei ole Euroopa Ravimiametis seni müügiloa taotlemise protsessi alustatud ühegi tootja tõhustusdoosi osas. Seega praegu kasutusel olevate vaktsiinide kasutamine tõhustusdoosideks oleks vaktsiini kasutamine heaks kiitmata näidustustel (ehk nn „off label use“ olukord). Tõhustusdooside aruteluks tuleb komisjon tagasi septembri II pooles pärast täiendavat Eesti andmete analüüsi, Euroopa Ravimiameti soovitusi ja/või teadusuuringute tulemuste saamist. Senised andmed näitavad, et COVID-19 vastaste vaktsiinide tõhusus raske haiguskulu ennetamisel on jätkuvalt väga hea, 90% ja rohkem. Ekspertkomisjon soovitab jätkata ettevalmistusi tõhustusdooside manustamise alustamiseks.
3. **Inimesed, kelle COVID-19 vastane vaksineerimine ei ole võimalik tervislikel põhjustel:** Vaktsiini manustamise vastunäidustuseks on ülitundlikkus vaktsiini toimeaine või mis tahes abiainete suhtes. Sellele lisandub Jansseni vaktsiini ja AstraZeneca vaktsiini puhul vastunäidustus inimestele, kellel on varem esinenud kapillaaride lekke sündroom. Väga raske haprussündroomiga (elu lõpufaasis) inimeste puhul tuleb hinnata, kas tal on võimalik saada vaksineerimiskuurist kasu.