

## Immunoprolaktika ekspertkomisjoni 5.04.2021 päevakord ja otsused

### PÄEVAKORD

1. AstraZeneca 2.doosi tegemine alla 60-aastastele inimestele;
2. AstraZenecaga vaktsineerimise alustamine alla 60-aastastel – kas on andmeid kehtiva soovitusel muutmiseks.

### OTSUSED

1. Inimestel, kellele on 1. doos tehtud Vaxzevria (firma AstraZeneca) vaktsiiniga, tuleks ka 2. doos teha Vaxzevria vaktsiiniga ning vaktsineerimiskuur kokkulepitud ajal lõpuni viia.

#### Selgitus

Vaktsineerimiskuur on oluline lõpuni viia, sest maksimaalse kaitse tekib 2-doosilise vaktsiini puhul pärast teist vaktsiinidoosi. Vaxzevria vaktsiiniga vaktsineerimise järel on esinenud valdavalt alla 60-aastastel inimestel väga harvad trombotsüütide vähesusega tromboosijuhud, mille täpset tekkemehhanismi alles uuritakse. Juhul, kui trombotsüütide vähesus ja tromboos 1. doosi järgselt ei tekkinud, on ekspertide hinnangul tõenäosus, et see 2. doosi manustamise järgselt tekib, väga väike. Vaxzevria vaktsiiniga vaktsineerimine ei suurenda ei eakatel ega noorematel patsientidel üldist trombiriski, sealhulgas ei suurenda vaktsineerimine jalaveenide ega kopsuveenide trombiriski ega ajuinsuldi riski. Lisaks on uuringute alusel teisi, teadaolevaid kõrvaltoimeid teise doosi järgselt tekkinud vähem ning need on leebemad.

Vaktsineeritavatel tuleks oma tervist pärast vaktsineerimist jälgida ning juhul, kui 20 päeva jooksul pärast vaktsineerimist tekib mõni järgmistest sümptomitest, võtta koheselt ühendust arstiga:

- vaktsineerimise järgselt üle 3 päeva kestev palavik,
- hingeldus,
- rindkere- või kõhuvalu,
- jäseme turse või jahedus,
- tugev/süvenev peavalu või ähmase nägemine,
- püsiv veritsus,
- väikesed verevalumid, punakad või lillakad täpid, verevillid nahal.

Vaktsineerijatel tuleks kindlasti vaktsineeritavaid täiendavalt informeerida sellest, milliste kaebuste ilmnemisel nad peaksid arstiga kiiresti ühendust võtma. Arstidele antakse täiendavad juhised võimaliku trombotsüütide vähesuse ja tromboosiga patsiendi käsitluse kohta.

2. 2-doosilise vaktsineerimiskuuri puhul tuleb teine doos manustada sama COVID-19 vaktsiiniga.

#### Selgitus

Hetkel puuduvad andmed erinevate tootjate COVID-19 vaktsiinide kombineerimise kohta.

3. Kuni täiendavate andmete laekumiseni mitte alustada Vaxzevria vaktsiiniga vaktsineerimiskuuri alla 60-aastastel, st 1. doosi alla 60-aastastele inimestele mitte manustada.

#### Selgitus

Kuigi Euroopa Raviamet ei ole oma ohuhinnangut Vaxzevria vaktsiini osas muutnud ning hindab kasu ja riski suhet jätkuvalt positiivseks, kaasneb valdavalt alla 60-aastaste inimeste Vaxzevria vaktsiiniga vaktsineerimisega potentsiaalne risk väga harva esinevate trombootilis-trombotsütopeeniliste juhtude esinemiseks. Seetõttu on nooremaid kui 60-aastaseid soovitatav Vaxzevria vaktsiiniga mitte vaktsineerida, kuni on olemas täiendavad andmed trombotsüütide vähesuse ja tromboosijuhtude tekkemehhanismi kohta, mis võimaldaks selle tekke riski vähendada. Võttes arvesse, et COVID-19 vastu tuleb esmajärgus vaktsineerida COVID-19 haigusest kõige ohustatumad, st vanemaealised ja kaasuvate haigustega inimesed, tuleb järgnevatel nädalatel keskenduda eelkõige nende sihtrühmade vaktsineerimisele.